

HIALURONATO DE SODIO

» CHINFIELD



Más movilidad,
mejor calidad de vida.



Restaurador de la función
articular y **condroprotector**.



Mejora la calidad
del líquido sinovial.



Disminuye el dolor
y la inflamación.



Recuperación
funcional **rápida**
y **segura**.

Alto peso molecular
1.800.000 Dalton.

SOLUCIÓN INYECTABLE



Presentación
en vial de 2ml

**HIALURONATO
DE SODIO
CHINFIELD®**

Peso Molecular: 1.800.000
USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA
CONTENIDO: 5 unidades x 2ml c/u
INDUSTRIA ARGENTINA

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR CHINFIELD S.A.
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS
Av. Adolfo 3205 (1605) Muro - Buenos Aires - Argentina
Tel.: 54-11-4782-5163 y 10141041
E-mail: info@chinfield.com - www.chinfield.com



BPFV
GMP

Certificado
Oficial
SENASA

FICHA TÉCNICA



» FÓRMULA:

Hialuronato de sodio	20 mg
Agentes de formulación c.s.p.	2 ml

» BENEFICIOS:

En el inicio de la osteoartrosis las articulaciones de los pacientes se caracterizan por la pérdida de moléculas de proteoglicanos en el cartilago articular. Estos cambios bioquímicos del cartilago en articulaciones afectadas no sólo están dados por la disminución de proteoglicanos, sino también de ácido hialurónico. El hialuronato sódico, (sal sódica del ácido hialurónico), es un polímero natural perteneciente a la clase de los glucosa-aminoglicanos (mucopolisacáridos ácidos). Es, por lo tanto, un componente fundamental del líquido sinovial que se caracteriza por su viscoelasticidad, higroscopicidad y propiedades lubricantes, cualidades que protegen a las articulaciones de la presión y fricción a las que están sometidas las superficies articulares, que se generan con el movimiento. La calidad y características del líquido sinovial está en relación directa con la salud articular del animal.

» INDICACIONES:

Para el tratamiento de las disfunciones articulares debidas a sinovitis no infecciosas asociadas con las osteoartritis. En tendovaginitis, post-cirugía articular o tendínea, post-lavaje articular, apoyo de reparación de fracturas articulares.

» PRESENTACIÓN:

Estuche conteniendo 5 frascos ampolla de 2 ml con 20 mg de Hialuronato de Sodio.

» POSOLOGÍA, DOSIS y VÍAS de ADMINISTRACIÓN:

Debe ser aplicado por médico veterinario.

Caninos:

Vía Intra Articular: 1 ml como dosis total en articulaciones pequeñas. 2 ml como dosis total en articulaciones grandes.

Vía Endovenosa Lenta: 1 ml cada 10 k.p.v. diluido en 1 ml de solución fisiológica o ringer.

» EFECTOS COLATERALES POSIBLES:

Locales: inflamación de la articulación que remite en 24 – 48 horas.

» PRECAUCIONES:

Dado que este producto es de uso intraarticular, su aplicación deberá realizarse bajo estrictas condiciones de asepsia y antisepsia. Evitar el uso de antisépticos locales como la clorhexidina y las sales de amonio cuaternario, incluyendo cloruro de benzalconio, ya que pueden causar la precipitación del hialuronato de sodio. Mezclar bien con la solución dilutora.

La administración de este producto requiere extrema atención en los siguientes casos:

Este producto puede empeorar la inflamación local en animales con artritis que cursen con una inflamación severa de la articulación. Se recomienda posponer la administración hasta que el síntoma local sea tratado y desaparezca.

El dolor local debido a la administración intraarticular de este producto no es frecuente, pero en caso que el dolor apareciera posterior a la aplicación, se deberá tratar de mantener al animal en reposo durante un tiempo corto. En caso de ser necesario repetir su administración, dejar transcurrir 7 días entre aplicaciones.

Suspender el tratamiento si no se observa mejoría de los síntomas después de la tercera aplicación.

En caso de ser aplicado en articulaciones con hidrartrosis, drenar previamente el líquido sinovial en exceso.

En caso de haberse conservado refrigerado, no aplicar frío. Deberá permitirse que incremente su temperatura antes de la administración.